

P69

بررسی ۵ ساله موارد گزارش شده فلج شل حاد استان اردبیل از سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱

منوچهر براک^۱، مسعود صبری^۲، داریوش امدادی^۳، قادر زکی پور^۴

۱. عضو هیئت علمی و فوق تخصص عفونی اطفال (دانشیار) و معاون بهداشتی دانشگاه، ۲. کارشناس ایمنسازی استان، ۳. کارشناس مسئول بیماریهای واگیر استان، ۴. معاون فنی مرکز بهداشت استان

مقدمه و اهداف: در سال ۱۹۸۸ میلادی مجمع جهانی بهداشت قطعنامه ریشه‌کنی فلج اطفال را به‌منظور پاک شدن کامل محیط از ویروس وحشی بیماری پولیومیلیت تصویب نمود. گذشت بیش از دو دهه از ریشه‌کنی فلج اطفال توسط WHO و استقرار نظام مراقبت انجام واکسیناسیون با استراتژی Mopping up از گسترش بیماری و گردش ویروس وحشی در بیش از ۱۲۵ کشور جلوگیری کند و فقط در چهار کشور (افغانستان، پاکستان، هند و نیجریه) ویروس وحشی در حال گردش می‌باشد. فلج شل حاد یک سندرم بالینی پیچیده با طیف وسیعی از اتیولوژی می‌باشد. تشخیص صحیح، گزارش به‌موقع و تهیه نمونه در درمان و پیش-آگهی بیماری اهمیت زیادی دارد. نظر به این‌که موارد فلج منجر به اختلال، ناتوانی و معلولیت می‌گردد، انجام اقدامات کنترلی لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد. هدف از این بررسی کشف سریع موارد جهت کاهش مرگ ناشی از فلج اطفال و ارتقای کیفیت خدمات در مراکز بهداشتی درمانی می‌باشد.

روش تحقیق و یافته‌ها: این مطالعه به‌صورت توصیفی گذشته‌نگر بوده و اطلاعات مربوطه از مراکز بهداشت شهرستان‌های تابعه جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. شاخص شناسایی فلج شل حاد براساس دستورالعمل کشوری دو درصد هزار نفر جمعیت زیر ۱۵ سال می‌باشد که در طی سال بررسی به شاخص مورد نظر دست یافته‌ایم. با تقویت و تشدید نظام مراقبت و گزارشدهی بیماری در سالهای اخیر تعداد موارد گزارش شده از ۷ مورد در سال ۱۳۸۷ به ۱۵ مورد در سال ۱۳۹۱ افزایش داشته است. تعداد ۱۵ مورد مشکوک به فلج شل حاد در سال ۱۳۹۱ گزارش شده که با توجه به جواب آزمایش دریافتی تمام موارد گزارش شده از نظر فلج اطفال مردود و طبق صورتجلسه کمیته طبقه‌بندی، ۱۱ مورد گیلن باره، دو مورد میوزیت، یک مورد التهاب مفصلی و یک مورد بیماری روماتیسم تشخیص و طبقه‌بندی شده‌اند.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها: با توجه به شاخص‌های مورد نظر WHO در نحوه گزارشدهی مورد AFP و زمان ارسال نمونه، نحوه نمونه‌گیری و زمان پاسخدهی آزمایشگاه، لازم است در هرکدام از موارد دقت بیشتری به‌عمل آید تا با توجه به همجوار بودن ایران با کشورهای آندمیک پولیو (پاکستان و افغانستان) و با توجه به رفت و آمدهای اتباع غیر ایرانی لزوم گزارشدهی به‌موقع در ریشه‌کنی بسیار مؤثر و ضروری می‌باشد.

کلمات کلیدی: اردبیل، فلج شل حاد، گیلن باره، ریشه‌کنی